

2021/7/28

Overcome COVID-19!

牟田病院 感染対策室 牟田(文責)、苗村、吉開

◆新型コロナウイルス感染症 発生状況◆ ※参照:厚生労働省報道発表資料等 ★…クラスター関連あり

		7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	
世界	感染者数	191,963,012	192,537,858	193,165,130	193,675,216	194,122,823	194,684,613	
	死亡者	4,126,606	4,135,375	4,143,162	4,151,915	4,158,749	4,167,226	
日本	全国	感染者	857,588	861,815	865,382	870,339	875,087	882,712
		治療中	35,022	36,798	37,090	39,236	40,618	44,785
		退院	807,459	809,901	813,168	816,035	819,329	822,774
		死亡	15,107	15,116	15,124	15,128	15,140	15,153
	福岡県	感染者累計	36,776 (+139)	36,927 (+152)	37,026 (+99)	37,188 (+162)	37,360 (+172)	37,596 (+236)
		ゲーグル予測(福岡県)	85	109	92	100	84	132
	福岡市	感染者累計	17,435	17,522	17,591	17,679	17,784	17,908
		1日感染者数	75	88	69	88	★105	★124
		PCR検査数	1,180	731	804	856	936	1,938
		陽性率	6.4%	12.0%	8.6%	10.3%	11.2%	6.4%
治療者数		395	471	501	557	645	739	
死亡者数		188	188	188	188	189	189	

●当院の取組み●

<全体>

- ・厳戒態勢実施中
(トリアージ、手指消毒徹底、マスク着用)
- ・原則、面会禁止(許可した人のみ)
- ・不要不急の外出禁止
- ・硬貨・紙幣を消毒
- ・室内換気(3回/日)
- ・便座消毒(使用前後)
- ・送迎車内換気
- ・出入口の制限
- ・会議は20-30分以内
- ・毎日検温
- ・会議室2部屋開放、
座席間隔拡大
- ・エレベーター使用制限
(極力階段使用・
最大3名までの乗車)
- ・院内コンビニ入店人数制限
- ・職員食堂 座席間隔拡大、
使用後除菌必須、
対面テーブルにパーテーション設置
- ・職員更衣室 数か所に分割移転
- ・事務部門 一部別フロアへ移転
対面デスクにパーテーション設置

◆国内感染者・死亡者数◆

発生地	感染者	死亡者
東京	203,568	2,279
大阪	110,483	2,719
神奈川	78,129	983
埼玉	53,316	846
愛知	52,986	1,005
千葉	46,464	731
北海道	43,296	1,424
兵庫	42,860	1,315
福岡	37,596	532

▲トピックス▲

福	福岡県独自"コロナ警報"発動 8月1日から 飲食店に時短要請へ	✖
東	東京都 新型コロナ 新たに 2848 人の感染 確認 過去最多	✖

飲食店利用で 5つのポイント 守ってほしい


長時間は NG	会話は マスク着用	座席は 固定
お酌はしない 回し飲みもしない	大声は NG	



出典:福岡県

●国・地域別の累計接種回数一覧●7/20 付

国・地域	100人あたり 接種回数	累計接種回数	感染者数の 7日移動平均
世界全体	-	3,694,304,188	517,116 (▲)
UAE	167.6	16,375,149	1,532 (▲)
マルタ	144.9	728,106	197 (▲)
セーシェル	143.0	139,625	77 (▼)
...			
英国	123.5	83,116,177	45,996 (▲)
...			
米国	101.9	338,132,479	34,730 (▲)
...			
日本	58.6	73,970,888	3,113 (▲)
...			
韓国	42.1	21,775,544	1,455 (▲)



ワクチンの特徴

ファイザー

モデルナ



ワクチンの種類	メッセンジャーRNA	
接種回数	2回(筋肉注射)	
発症予防効果	95%	94%
副作用	注射部位の痛み、頭痛、筋肉痛、発熱など。まれにアナフィラキシー	
主な保管方法	超低温冷凍 (-70°C程度)	冷凍 (-20°C前後)

出典: 日本経済新聞、Yahoo



接種後の注意点



接種後の生活上の注意点は?

接種部位の痛みや倦怠感、発熱や頭痛などの症状がでる場合がある。接種当日・翌日は無理をしない計画に

車の運転は?

体調良好であれば運転に問題なし。不安な場合は運転を控える

入浴はできる?

入浴できる。注射した部位を強くこするのは避ける

マスクは必要?

必要。3密回避や手洗いなど引き続き実施を


(注)厚労省サイトから、かかりつけ医との事前相談を推奨

接種から効果までの目安

	ファイザー	モデルナ
接種間隔	3週間	4週間
効果が出る目安	2回目の7日後以降	2回目の14日後以降

福岡を守ろう

- NO MORE 緊急事態宣言 -



引き続き、基本的感染防止対策の徹底を

- ☑三密の回避
- ☑マスク着用
- ☑手洗い
- ☑換気

出典: 福岡市