

Overcome COVID-19!

2023/1/18

牟田病院 感染対策室 牟田(文責)、苗村、吉開

◆新型コロナウイルス感染症 発生状況◆ ※参照:厚生労働省報道発表資料等 ★…クラスター関連あり

世界		1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17
感染者数		665,621,482	666,125,230	666,565,625	666,786,373	666,981,668	667,194,514
死亡者		6,714,472	6,718,943	6,721,800	6,722,699	6,723,513	6,724,711
日本	全 感染者	31,055,159	31,198,502	31,331,040	31,438,179	31,490,782	31,621,098
	国 死亡	61,839	62,362	62,739	63,007	63,363	63,854
	福 感染者累計	1,472,465	1,480,651	1,488,133	1,494,250	1,496,257	1,502,596
	岡 県 (+11,200)	(+11,200)	(+8,186)	(+7,482)	(+6,117)	(+2,007)	(+6,339)
	福 感染者累計	486,415	488,563	490,721	492,068	492,401	494,233
	岡 市 1日感染者数	2,836	2,148	2,158	1,347	333	1,832
死 死亡者数	599	606	—	—	614	622	

※感染が確認された人の「全数把握」が全国一律で見直されたことを受け、表示内容を一部変更しております。

●当院の取組み●

<全体>

- ・厳戒態勢実施中
(トリアージ、手指消毒徹底、マスク着用)
- ・原則、面会禁止(許可した人のみ)
- ・不要不急の外出禁止
- ・硬貨・紙幣を消毒
- ・室内換気
- ・便座消毒(使用前後)
- ・送迎車内 換気
- ・出入口の制限
- ・会議は 20-30 分以内
- ・毎日検温
- ・会議室2部屋開放、座席間隔拡大
- ・エレベーター使用制限
(極力階段使用・最大3名までの乗車)
- ・院内コンビニ入店人数制限
- ・職員食堂 座席間隔拡大、使用後除菌必須、対面テーブルにパーテーション設置
- ・職員更衣室 数か所に分割移転
- ・事務部門 一部別フロアへ移転 対面デスクにパーテーション設置

◆国内感染者・死亡者数◆

発生地	感染者	死亡者
東京	4,192,686	7,273
大阪	2,705,282	7,636
神奈川	2,114,541	3,844
愛知	1,992,922	3,807
埼玉	1,715,861	3,293
福岡	1,502,596	2,703
千葉	1,385,392	3,281
兵庫	1,383,124	3,433
北海道	1,285,991	4,271

▲トピックス▲

日 新型コロナ インフルより“後遺症”リスク高い 名古屋工業大 △

福岡オミクロン警報 発動中

県民の皆様へのお願い!

1 基本的な感染防止対策の徹底
(マスクの正しい着用、手指消毒、三密回避、換気等)

2 会食・会合は感染防止認証店を利用



	ゾコーバ®	ラゲブリオ®	パキロビッド®	中和抗体薬®	レムデシビル
長所	<ul style="list-style-type: none"> 重症化リスクがなくても使える 症状出現期間が短くなる 副作用が少ない BA.5にも有効 1日1回内服 	<ul style="list-style-type: none"> 他の薬を定期内服しても使いやすい 重症化リスク30%低下 BA.5株にも有効性あり 	<ul style="list-style-type: none"> 重症化リスク88%低下 BA.5株にも有効性あり 妊婦にも有益性が上回る場合に投与できる 	<ul style="list-style-type: none"> 変異株の種類により効果が変動する 抗体とウイルスがきちんと結合できると効果が高い 副作用はほとんどない 	<ul style="list-style-type: none"> 重症化リスク87%低下 BA.5株にも有効性あり
短所	<ul style="list-style-type: none"> 原則発症3日以内に服用 多くの薬との飲み合わせが悪い 重症化予防効果はない 妊娠中、授乳中は使えない 	<ul style="list-style-type: none"> 原則発症5日以内に服用 妊娠中は使えない 消化器症状やめまいなどの副作用が稀にある 粒が大きく高齢者は内服が大変 	<ul style="list-style-type: none"> 原則発症5日以内に服用 多くの薬との飲み合わせが非常に悪い 味覚不全や消化器症状があることも 	<ul style="list-style-type: none"> BA.5になり有効性が一部の中和抗体薬で大きく低下 注射薬 	<ul style="list-style-type: none"> 発症7日以内投与 3日間以上の点滴が必要

社名 薬剤名 承認状況 (特徴)

塩野義製薬 **ゾコーバ** 11月22日に緊急承認

モルヌヒラビル 昨年12月に特例承認

米ファイザー **パキロビッド** 2月に特例承認

米メルク **レムデシビル**

MSD **パキロビッド**

※写真は塩野義製薬、MSD、ファイザー提供

《特徴》
 重症化リスクがない人にも投与可能。妊婦は禁忌。飲み合わせに注意が必要。薬が多い。
 重症化リスクがある人に投与可能。妊婦は禁忌。飲み合わせに注意が必要。薬が多い。

出典：ひまわり医院(東京都)

出典：西日本新聞


【オミクロン株対応ワクチン】12歳以上の接種状況

オミクロン株対応ワクチン接種完了

543,047人

(福岡市)


1・2回目接種が完了した12歳以上の方の人数に対する接種率



オミクロン株対応ワクチンの接種状況 (表)

年代	接種済
70代以上	70%
60代	64%
50代	50%
40代	35%
30代	25%
20代	20%
10代(12歳以上)	33%
全年代	45%
65歳以上	70%

オミクロン株対応ワクチンの副反応の頻度は？



出典：ヤフーニュース