

Overcome COVID-19!

2023/1/20

牟田病院 感染対策室 牟田(文責)、苗村、吉開

◆新型コロナウイルス感染症 発生状況◆ ※参照:厚生労働省報道発表資料等 ★…クラスター関連あり

世界		1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19
感染者数		666,565,625	666,786,373	666,981,668	667,194,514	667,532,987	667,918,207
死亡者		6,721,800	6,722,699	6,723,513	6,724,711	6,726,590	6,729,788
日本		1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19
全 国	感染者	31,331,040	31,438,179	31,490,782	31,621,098	31,744,742	31,840,682
	死亡	62,739	63,007	63,363	63,854	64,284	64,708
福 岡 県	感染者累計	1,488,133 (+7,482)	1,494,250 (+6,117)	1,496,257 (+2,007)	1,502,596 (+6,339)	1,509,069 (+6,473)	1,513,467 (+4,398)
	1日感染者数	2,158	1,347	333	1,832	1,780	1,016
福 岡 市	感染者累計	490,721	492,068	492,401	494,233	496,013	497,029
	死亡者数	—	—	614	622	631	639

※感染が確認された人の「全数把握」が全国一律で見直されたことを受け、表示内容を一部変更しております。

●当院の取組み●

<全体>

- ・厳戒態勢実施中
(トリアージ、手指消毒徹底、マスク着用)
- ・原則、面会禁止(許可した人のみ)
- ・不要不急の外出禁止
- ・硬貨・紙幣を消毒
- ・室内換気
- ・便座消毒(使用前後)
- ・送迎車内 換気
- ・出入口の制限
- ・会議は 20-30 分以内
- ・毎日検温
- ・会議室2部屋開放、座席間隔拡大
- ・エレベーター使用制限
(極力階段使用・最大3名までの乗車)
- ・院内コンビニ入店人数制限
- ・職員食堂 座席間隔拡大、使用後除菌必須、対面テーブルにパーテーション設置
- ・職員更衣室 数か所に分割移転
- ・事務部門 一部別フロアへ移転 対面デスクにパーテーション設置

◆国内感染者・死亡者数◆

発生地	感染者	死亡者
東京	4,209,592	7,335
大阪	2,719,751	7,693
神奈川	2,126,671	3,888
愛知	2,007,873	3,846
埼玉	1,725,907	3,341
福岡	1,513,467	2,767
兵庫	1,394,856	3,485
千葉	1,394,711	3,329
北海道	1,290,809	4,292

▲トピックス▲

日 新型コロナ 政府 ことし春にも「5 類」移行を目指す方針固める △

福岡オミクロン警報 発動中

県民の皆様へ
のお願い!

1 基本的な感染防止対策の徹底
(マスクの正しい着用、手指消毒、三密回避、換気等)

2 会食・会合は感染防止認証店を利用



	ゾコーバ®	ラゲブリオ®	パキロビッド®	中和抗体薬®	レムデシビル
長所	<ul style="list-style-type: none"> 重症化リスクがなくても使える 症状出現期間が短くなる 副作用が少ない BA.5にも有効 1日1回内服 	<ul style="list-style-type: none"> 他の薬を定期内服しても使いやすい 重症化リスク30%低下 BA.5株にも有効性あり 	<ul style="list-style-type: none"> 重症化リスク88%低下 BA.5株にも有効性あり 妊婦にも有益性が上回る場合に投与できる 	<ul style="list-style-type: none"> 変異株の種類により効果が変動する 抗体とウイルスがきちんと結合できると効果が高い 副作用はほとんどない 	<ul style="list-style-type: none"> 重症化リスク87%低下 BA.5株にも有効性あり
短所	<ul style="list-style-type: none"> 原則発症3日以内に服用 多くの薬との飲み合わせが悪い 重症化予防効果はない 妊娠中、授乳中は使えない 	<ul style="list-style-type: none"> 原則発症5日以内に使用 妊娠中は使えない 消化器症状やめまいなどの副作用が稀にある 粒が大きく高齢者は内服が大変 	<ul style="list-style-type: none"> 原則発症5日以内に使用 多くの薬との飲み合わせが非常に悪い 味覚不全や消化器症状があることも 	<ul style="list-style-type: none"> BA.5になり有効性が一部の中和抗体薬で大きく低下 注射薬 	<ul style="list-style-type: none"> 発症7日以内投与 3日間以上の点滴が必要

社名 薬剤名 承認状況 (特徴)

塩野義製薬 **ゾコーバ** 11月22日に緊急承認

モルヌヒラビル 昨年12月に特例承認

米ファイザー **パキロビッド** 2月に特例承認

米メルク **ミフアイザー**

※写真は塩野義製薬、MSD、ファイザー提供

《特徴》
 重症化リスクがない人にも投与可能。妊婦は禁忌。飲み合わせに注意が必要。薬が多い。
 重症化リスクがある人に投与可能。妊婦は禁忌。飲み合わせに注意が必要。薬が多い。

(各添付文書などをもとに作成)

出典: ひまわり医院 (東京都)


出典: 西日本新聞

【オミクロン株対応ワクチン】12歳以上の接種状況


オミクロン株対応ワクチンの接種状況 (表)



年代	接種済
70代以上	73%
60代	66%
50代	51%
40代	36%
30代	26%
20代	21%
10代(12歳以上)	34%
全年代	47%
65歳以上	72%



オミクロン株対応ワクチンの副反応の頻度は？



出典: ヤフーニュース